

EFFETS INDESIRABLES INDUITS PAR LES SOINS

 *Les Med'Océanes* / 11 septembre 2013



Intervenants :

SEDDIKI Issam

DUPAIGNE Emma

Experts :

GALLAND Marie-Claude

MARODON Claude

Conflits d'intérêt :



- aucun

Med'Océan :



Les Med'Océanes

Objectifs :

- Information du public
- Echange d'expériences
- Élaboration de solutions



Afin d'améliorer les pratiques
Pour une meilleure qualité des soins

Quiz :



- Qu'est ce qu'un effet indésirable ?
- Ne concerne que les médicaments ?
- Problème fréquent ?
- Conséquences graves ?
- Toujours évitable ?
- Qui est concerné ?
- Qui peut être responsable ?
- Exemples ?


Principes de prévention :




Éviter l'évitable :

- **Adopter un choix raisonné en évitant les actes inutiles**
- **Priorité aux thérapeutiques dont l'efficacité est démontrée, et les risques bien connus.**
- **Responsabiliser des patients**
- **Former les professionnels**
- **Pharmacovigilance**

Primum non nocere



Responsabilité(s) :



Modèle de REASON

1. L'Industrie pharmaceutique / Fabricant :



Conditionnement
Génériques

Influence de la promotion pharmaceutique sur les décisions



HAS 2013 - Comprendre la promotion pharmaceutique


2. Le législateur / AMM



Transparence


Évaluation du service médical rendu

3. Le médecin / prescripteur



Savoir ne pas prescrire

Poly médication



interaction médicamenteuse

crifa
N° 85.143

Identification du dispensateur
Pharmacie **Pharmacie** 5700
[Redacted] [Redacted]
[Redacted] [Redacted] [Redacted] [Redacted]
[Redacted] [Redacted] [Redacted] [Redacted]

B. L. WASSER
[Redacted] [Redacted] [Redacted] [Redacted]

Prescriptions prescrites en traitement de l'affection de longue durée relevée (liste ou hors liste)
MAGNÉSIUM BUNERANTE: de 09 jours 35

01 - Augmentin - 1g, le matin (2tblts)
02 - Augmentin - 1g, le matin (1tblt)
03 - Tétracycline - 2g, avant le repas (1tblt)
04 - Pravastatine - 1g, matin et soir (2tblts)
05 - Metformine - 1g, avant le repas (2tblts) 09 JAN 1999
06 - Valproate - 1g, le soir (1tblt)
07 - Warfarine - 2g, après le repas (1tblt)
08 - Aspirine - 1g, le soir (1tblt)

Prescriptions SANS RAPPORT avec l'affection de longue durée
MAGNÉSIUM BUNERANTE: 09

01 - Salbutamol - 1g, au besoin (1tblt)
02 - Terbutaline - 1g, au besoin (1tblt)
03 - Ephédrine - 1g, 3 fois/jour (3tblts)
04 - Nitroglycérine - 1g, 1 fois/jour (1tblt)
05 - Acétylsalicylate - 1g, matin et soir (2tblts)
06 - Rétronil - 1g, matin et soir (2tblts)
07 - Carbocisteine - 1g, avant le repas (1tblt)

09 JAN 1999

Information du patient



4. Le pharmacien / Dispensation



cohérence des prescriptions

5. Le patient / « consommateur »



Acteur de sa santé

Automédication

Le médicament n'est pas un produit
comme les autres



6. Les Politiques de santé publique : Dépistage de masse

CANCER DE LA PROSTATE... NE PASSEZ PAS À UN DOIGT DU DIAGNOSTIC !



Didier PLEUX
psychologue

Dr William LOWENSTEIN
addictologue

Pr Patrick MADELENAT
gynécologue

Dr Michel CYMES

Pr François HAAË
urologue

Dr Sylvain MIMOUN
psychosomaticien

Dr Philippe BATEL
addictologue

Dr Eric JOUSSELIN
médecin du sport

Christian GERIN
producteur du magazine de la santé

Pr Arnaud MEJEAN
urologue

Pr François DESGRANCHAMPS
urologue

Dr Philippe GODEBERGE
proctologue

Pr Alain SERRIE
spécialiste de la douleur


Dr Alain LONDERO
ORL

Tous les cancers de la prostate ne doivent pas être traités mais tous doivent être dépistés par un toucher rectal et une prise de sang.
À PARTIR DE 50 ANS, PARLEZ-EN À VOTRE MÉDECIN

Surdiagnostic et surtraitement

7. L'infirmières / administration

- Vérification des thérapeutiques avant administration





Tératogénie



- Toute femme en âge de procréer est enceinte jusqu'à preuve du contraire

Actes chirurgicaux

ELLE VIT 6 MOIS AVEC UNE PINCE CHIRURGICALE DANS LE VENTRE ...

DOCTEUR, VOUS M'AVEZ OUBLIÉ ÇA DANS LE BIDE!

... LA VOILÀ ENFIN...
J'ALLAIS PORTER PLAINTE
POUR VOL, MOI ...



Infections nosocomiales

BASSE DES INFECTIONS NOSOCOMIALES ..



Erreurs médicales



Les populations fragiles :

- peu d'études spécifiques chez certaines catégories : personne âgée, femmes enceintes, enfants



Faites du sport ...





MERCI